

Bedside Swallow Assessment

| | | |
|------------------------------------|--|-----|
| Livello di coscienza | 1=vigile,2=soporoso ma risvegliabile,3=non apre gli occhi ma risponde a stimoli verbali,4=risponde solo a stimoli dolorosi | [] |
| Controllo del tronco e della testa | 1=tronco normale,2=posizione del tronco non mantenuta,3=controllo solo della testa,4=non controllo testa | [] |
| Respirazione | 1=normale 2=patologica | [] |
| Chiusura delle labbra | 1=normale 2=patologica | [] |
| Movimento del palato | 1=simmetrici, 2=asimmetrici, 3=minimi-assenti | [] |
| Funzione laringea | (Aah/ee) 1=normale, 2=ridotta, 3=assente | [] |
| Riflesso della deglutizione | 1=presente, 2=assente | [] |
| Riflesso della tosse | 1=normale, 2=ridotto, 3=assente | [] |

Stadio 1: assunzione di 5 ml di acqua in un cucchiaino, per 3 volte

| | | |
|--|------------------------------------|-----|
| Rifiuta l'acqua | 1= mai o una volta 2= più volte | [] |
| Movimenti laringei con tentativi di deglutizione | 1= si 2=no | [] |
| Movimenti ripetitivi | 1= mai o una volta 2= più volte | [] |
| Tosse durante la deglutizione | 1= mai o una volta 2= più volte | [] |
| Gorgoglio dopo la deglutizione | 1= no 2=si | [] |
| Funzione laringea dopo la deglutizione | 1=normale, 2=disfonia, 3=afonia | [] |

Stadio 2: Se la deglutizione è normale nel primo stadio, si somministrano 60 ml di acqua

| | | |
|--|---------------------------------|-----|
| È in grado di terminare? | 1= si 2= no | [] |
| Tempo necessario per terminare ,in secondi | | [] |
| Numero di sorsi necessari | | [] |
| Tosse durante o dopo la deglutizione | 1= no 2= si | [] |
| Gorgoglio durante o dopo la deglutizione | 1= no 2=si | [] |
| Funzione laringea dopo la deglutizione | 1=normale, 2=disfonia, 3=afonia | [] |
| Sensazione di aspirazione | 1=no, 2=possibile, 3=si | [] |